

Ingrediente activo: Mancozeb
Grupo químico: Dithiocarbamate
Nombre Comercial: FUNGIS-KHAN®
Formulación: Polvo Mojable (WP)
Concentración: 800 g i.a./kg P.C.
pH: 8.9
Modo de acción: Contacto con acción preventiva
Uso: Fungicida Agrícola
Toxicidad: III. Ligeramente peligroso

mismo día de preparada. Procure un cubrimiento total y uniforme en el follaje.

Periodo de reingreso al área tratada:
12 horas.

Periodo de carencia:

Papa: 14 días. **Cebolla, Melón, Pimiento, Maíz, Brócoli, Banano:** 7 días. **Arroz:** 20 días.

1. COMPOSICIÓN:

No.	Ingredientes	Porcentajes
1	Mancozeb	80.0
2	ETU	30.0 ppm
3	Inertes	hasta 100.0

2. DESCRIPCIÓN:

Fungis-Khan® es un fungicida, pertenece al grupo químico de los Dithiocarbamates, es un producto preventivo, de contacto, con acción multisitio que controla un sinnúmero de enfermedades producidas por hongos, en una amplia gamma de cultivos.

3. MECANISMO DE ACCIÓN:

Reacciona e inactiva los grupos sulfidrilos de aminoácidos y enzimas de las células de hongo, lo que provoca la interrupción del metabolismo de los lípidos, respiración y producción de ATP.

4. USO Y APLICACIÓN:

Uso aprobado:

Cultivo	Plaga	Dosis kg/ha	Recomendación
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha tardía (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.0	Realizar dos aplicaciones con el apareamiento de los primeros síntomas, con un intervalo de 5-10 días.
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Mildiu veloso (<i>Peronospora destructor</i>)	2.0	Realizar dos aplicaciones de manera preventiva con un intervalo de 7 días
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mildiu veloso (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.0	Debe ser aplicado de manera preventiva, repetir el tratamiento en un intervalo de 7-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas que favorezcan la presencia de la enfermedad
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Oidio (<i>Oidium</i> sp.)	1.5	Realizar dos aplicaciones con el apareamiento de los primeros síntomas, con un intervalo de 10 días
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Tizón de la hoja (<i>Helminthosporium maydis</i>)	0.75	Realizar una sola aplicación en forma preventiva o con el apareamiento de los primeros síntomas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp.)	2.5	Aplicar en dos ocasiones, de manera preventiva, 10 días después del trasplante, con intervalo de 14 días.
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	Mancha foliar (<i>Alternaria brassicae</i>)	2.5	Realizar dos aplicaciones con intervalo de 7 días.
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.5 kg/ha	Realizar una aplicación al aparecer los síntomas (estado 1, pizca) o en forma preventiva.

Volumen de agua: En todos los cultivos se debe realizar una calibración de los equipos de aplicación, a fin de determinar el gasto de agua en relación a la fenología del cultivo.
Banano: 60 litros/ha.

Preparación de la mezcla: Previamente regular el pH del agua a 5 y adicionar un adherente no iónico. Verter la cantidad de Fungis-Khan® en el volumen de agua requerido y agitar lo suficiente hasta lograr una mezcla homogénea. Mantener la mezcla en constante agitación y asperjarla el

Compatibilidad:

FUNGIS-KHAN® es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas usados. No debe ser mezclado con producto de fuerte reacción alcalina, con productos azufrados y caldo bordelés, mezclas de arseniato de calcio o urea.

Fitotoxicidad:

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo

5. PRESENTACIONES:

Fundas de 1 y 25 kg.

6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO:

Almacenarlo en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, seco y sin luz directa). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS:

Primeros Auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** no induzca el vómito.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SOLAGRO S.A. Teléfono 02-6016686-Quito.

NÚMERO DE REGISTRO: 1 - F 84 / NA

FORMULADO POR: NORTHERN INTERNATIONAL CO LTD.

PAÍS DE ORIGEN: CHINA

DISTRIBUIDO POR: SOLAGRO S.A.
Calle Eloy Alfaro s/n y De Los Cardenales, Cumbayá.
Quito-Ecuador
Teléfono.: 02 6016686