

Ingrediente activo: Pendimethalin
Grupo químico: Dinitroanilina
Nombre Comercial: PAROLI®
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Concentración: 400 g i.a./l P.C.
Modo de acción: Sistémico, selectivo y residual
Uso: Herbicida Agrícola
Toxicidad: III. Ligeramente peligroso

1. COMPOSICIÓN:

No.	Ingredientes	Porcentajes
1	Pendimethalin	40.0
2	Aditivos	hasta 100.0

2. DESCRIPCIÓN:

Paroli® es un herbicida selectivo y residual que se absorbe por la radícula y epicótilo. Puede aplicarse en preemergencia (incorporado) y pos-emergencia temprana contra malezas gramíneas anuales y algunas de hoja ancha.

3. MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa inhibiendo la división y elongación celular en los puntos de crecimiento o meristemas del tallo y las raíces

4. USO Y APLICACIÓN:

Aprobado para:

Cultivo	Plaga	Dosis l/ha	Recomendación
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Cabezonillo (<i>Cyperus esculentus</i>) Paja de patillo (<i>Echinochloa colona</i>)	2.0	Se recomiendan efectuar 1 sola aplicación, tres días después del trasplante del arroz.

Volumen de agua: 360 litros de agua/ha

También recomendado para:

Cultivo	Plaga	Dosis l/ha	Recomendación
Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	Liendre de puerco (<i>Echinochloa colona</i>) Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>)	2.0- 3.5	Aplicar en pre siembra o pre-emergencia
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	2.0-3.5	Aplicar después del trasplante
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Guardarocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	2.5 suelo liviano 4.0 suelo pesado	Aplicar en pre-emergencia mezclando con atrazina
Sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)	Pasto Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemus rugosum</i>)	3.0	Aplicar en pos-emergencia mezclando con atrazina (cuando el maíz tenga 1-2 hojas)
Soya (<i>Glycine max</i>)	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	2.5 suelo liviano 4.0 suelo pesado	Aplicar en pre-siembra o en pre-emergencia (1 día después de la siembra)

Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla verter la cantidad necesaria de Paroli® al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de aplicación terrestre.

Periodo de reingreso al área tratada:

12 horas.

Periodo de carencia:

Arroz: No aplica

Compatibilidad:

Paroli® es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Fitotoxicidad:

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo recomendado. Tener en cuenta que el producto es un herbicida, por lo tanto evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

5. PRESENTACIONES:

Envase de 1 Litro y 9.5 Litros.

6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano y animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, seco y sin luz directa). Conservar el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado.

7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS:

Primeros Auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** no induzca el vómito.

Síntomas: Nauseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Tos, disnea, rinitis, aumento de las secreciones. Irritación de piel y mucosas. Dermatitis. Irritación de ojos y mucosas. Lacrimeo, conjuntivitis.

Tratamiento y antídoto: Tratamiento evacuante mediante la realización de lavado gástrico. Administración de carbón activado. Administración de un laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SOLAGRO S.A. Teléfono 02-6016686-Quito.

NÚMERO DE REGISTRO: 34 - H 8/NA
FORMULADO POR: NORTHERN INTERNATIONAL CO LTD.

PAÍS DE ORIGEN: CHINA
DISTRIBUIDO POR: SOLAGRO S.A.
Calle Eloy Alfaro s/n y De Los Cardenales, Cumbayá.
Quito-Ecuador
Teléfono.: 02 6016686