

**Ingrediente activo:** Imidacloprid  
**Grupo químico:** Neonicotinoide  
**Nombre Comercial:** TABU®  
**Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)  
**Concentración:** Imidacloprid 500 g i.a./l P.C.  
**Modo de acción:** Sistémico y Contacto, con acción por ingestión  
**Uso:** Insecticida agrícola  
**Toxicidad:** II. Moderadamente Peligroso

**1. COMPOSICIÓN:**

No.	Ingredientes	Porcentajes
1	Imidacloprid	50.0
2	Aditivos	hasta 100.0

**2. DESCRIPCIÓN**

TABU es un insecticida para tratamiento de semillas de acción sistémica y efecto de control prolongado protegiendo las mismas por más de 40 días los cultivos en su etapa de desarrollo inicial, además para aplicación foliar. Por su alta sistémica permite la protección de los puntos de crecimiento de hojas nuevas.

**3. MECANISMO DE ACCIÓN:**

Actúa como agonista sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina del sistema nervioso central, primero estimulando las membranas pos-sinápticas y después paralizando la conducción nerviosa.

**4. USO Y APLICACIÓN:**

Uso aprobado:

Cultivo	Plaga	Dosis l/ha*	Recomendación
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	3.3 cc/kg semilla	Aplicar directamente a la semilla diluyendo en 5 cc agua/kg semilla antes de la siembra
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )		3.5 cc/kg semilla	
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Sogata ( <i>Togamosodes orizicolus</i> )	0.2	Aplicar una vez por ciclo con la presencia del insecto o dependiendo de la presión de la plaga
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0.2	

\* Gasto de agua: Arroz: 300 l/ha. Tomate riñón: 400 l/ha

**Preparación de la mezcla:**

**Aplicación foliar:** llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua y adicione la cantidad de producto a aplicar según las dosis recomendadas, agite y complete el tanque con agua. Mantener agitación constante de la mezcla y aspérgala el mismo día de preparada. Garantizar un cubrimiento total de las plantas a tratar. Seguir los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante de los equipos.

**Para tratar las semillas:** En un local apropiado mezclar la semilla con una solución conteniendo 5 ml de agua/ kg semilla y la dosis de TABU®, asegurándonos que toda la semilla quede impregnada y protegida con el producto. Aplicar el producto con un aspersor de mochila sobre la semilla y mezclar en forma homogénea con una pala. Deje secar la semilla a la sombra por 30 minutos. Sembrar el mismo día que se trató la semilla, evitar guárdala si las condiciones en el campo no son las correctas. En tratamiento por medio de máquinas especiales usado en empresas que manejan semillas realizar según recomendaciones de los fabricantes, garantizando la aplicación homogénea.

**Periodo de reingreso al área tratada:**

Tratamiento de semillas: No aplica. Aplicación foliar: 24 horas.

**Periodo de carencia:**

Tratamiento de semillas: No aplica. Aplicación foliar: Arroz: 30 días. Tomate riñón: 7 días.

**Compatibilidad:**

No se conocen restricciones de su uso. Sin embargo se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala en caso de dudas.

**Fitotoxicidad:**

A la dosis y condiciones recomendadas no presenta fitotoxicidad en la emergencia de las semillas.

**5. PRESENTACIONES:**

Envases de 100 ml y 500 ml.

**6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano y animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, seco y sin luz directa). Conservar el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado.

**7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS:**

**Primeros Auxilios:**

**En caso de inhalación,** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.


**En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión,** no induzca el vómito.

**Tratamiento y antídoto:** No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta."

	<p><b>EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:</b> 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AVGUST CROP PROTECCIÓN ECUADOR S.A. Teléfono 02-2901001-Quito.</p>
---	--

**NÚMERO DE REGISTRO:** 68 - I 24 / NA  
**FORMULADO POR:** JSC ANGUST INC  
**PAÍS DE ORIGEN:** RUSIA  
**TITULAR DE REGISTRO:** AVGUST CROP PROTECCION ECUADOR S.A.  
**DISTRIBUIDO POR:** SOLAGRO S.A.  
Calle Eloy Alfaro s/n y De Los Cardenales, Cumbayá. Quito-Ecuador  
Teléfono.: 02 6016686