

### DATOS GENERALES

<b>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:</b>	<b>AVGUST - ECUADOR S.A.</b> Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
<b>CLASE:</b>	ACARICIDA
<b>FORMULACIÓN:</b>	Polvo Mojable (WP)
<b>REGISTRO NACIONAL N°:</b>	5 – A5/NA
<b>PRESENTACIONES AUTORIZADAS:</b>	50 g, 100 g, 500 g, 25 kg
<b>INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:</b>	<p><b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO</b></p> <p><b>CUIDADO</b></p> 

### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>COMPOSICIÓN GARANTIZADA:</b>	Ingrediente activo: Hexythiazox.....100 g/kg Ingredientes inertes.....c.s.p. 1 kg
<b>MODO DE ACCIÓN:</b>	Contacto, con acción estomacal y translaminar
<b>MECANISMO DE ACCIÓN:</b>	<b>HEXMITE</b> Actúa inhibiendo el crecimiento y desarrollo de los ácaros. Posee efecto residual y actividad translaminar.
<b>GRUPO QUÍMICO:</b>	Hexythiazox
<b>CÓDIGO IRAC:</b>	10A

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidad	pH	Presión vapor
0.5 mg/L a 20 °C	4.5 - 7	2.55x10 <sup>-8</sup> mm Hg a 20 °C
K <sub>ow</sub>	K <sub>oc</sub>	PM
5.57	6200	352.9

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	Ácaro rojo ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.80 kg/ha*	N.A.	12
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Araña roja ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.20 kg/ha	45	12

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

\*\*\*N.A.: No aplica

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

**Rosas:** Se recomiendan efectuar una sola aplicación por ciclo. Se aplica cuando hay de dos a tres formas móviles por foliolo.

**Maíz:** Efectuar una sola aplicación por ciclo, con la presencia de 5-6 formas móviles por hoja, en etapa fenológica vegetativa (prefloración)

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla verter la cantidad necesaria de **HEXMITE®** al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente.

Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de aplicación terrestre. Procuren un cubrimiento total y uniforme.

### VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

**Rosas:** 1600 litros/ha de rosas en producción.

**Maíz:** 400 litros/ha

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

HEXMITE® es incompatible con productos alcalinos. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:



ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX

1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	25-01-2022	ECU