



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST-ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
CLASE:	BACTERICIDA
FORMULACIÓN:	Suspensión concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL N°:	1 B3NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	200 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 5 L, 10 L, 20 L y 200 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA 4– LIGERAMENTE PELIGROSO ATENCIÓN 

INFORMACIÓN TÉCNICA

	COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Ingrediente activo: Ácido oxolínico.....200 g/l Ingredientes inertes.....C.s.p. 1 L
MODO DE ACCIÓN:	Contacto
MECANISMO DE ACCIÓN:	NOVANEO se fija al xilema y luego viaja a los puntos de crecimiento. Disminuye la capacidad de multiplicación de las bacterias ya que afecta la replicación del ADN interrumpiendo la reproducción bacteriana.
GRUPO QUÍMICO:	Quinolina

CÓDIGO FRAC:	31	
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Densidad	Inflamabilidad
	1.08 mg.L ⁻¹	No irritante > 100°C

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo bacterial (<i>Burkholderia glumae</i>)	1.25 L/ha	12	48

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en dos ocasiones, con un intervalo de frecuencia de 7 días, cuando el cultivo se encuentre en etapa de desarrollo vegetativo en presencia de los primeros síntomas de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Realizar la aplicación en forma foliar, utilizando una bomba de espalda.

Debe aplicárselo diluido en agua, para lo cual primero se coloca la cantidad de agua hasta la mitad del tanque de mezcla, luego se agrega la cantidad de producto requerido (dosis recomendada) para agitar hasta homogeneizar la mezcla. Finalmente, se adicional el resto de la cantidad de agua necesaria.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Volumen de agua: Arroz: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Producto compatible con los insecticidas más utilizados, fungicidas, herbicidas y fertilizantes líquidos, sin embargo, es incompatible con materiales alcalinos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686 Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	15-05-2023	ECU