

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL N°:	33-H6/NA-CL1
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	250 cc, 1 L, 200 L
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	<p>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO</p> <p>CUIDADO</p> 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	<p>Ingrediente activo:</p> <p>Metribuzin.....480 g/L</p> <p>Monoethylene glycol.....63 g/L</p> <p>Excipientes.....1 L</p>
MODO DE ACCIÓN:	<p>ALMAT es un herbicida sistémico para el control de las malas hierbas anuales gramíneas y dicotiledóneas, en preemergencia o postemergencia precoz, en el cultivo de papa.</p> <p>Es un herbicida de pre y post emergencia; sistémico y selectivo, absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas, con translocación acropetal a en el xilema.</p>
MECANISMO DE ACCIÓN:	<p>ALMAT es un inhibidor del transporte de electrones en el receptor de electrones del fotosistema II.</p>

GRUPO QUÍMICO:	Triazinas		
CÓDIGO FRAC:	C1		
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Densidad	pH	Presión vapor
	1,12 g/ml a 21,30°C	6.60	0,121 mPa a 25°C
	K_{ow}	K_{oc}	PM
	1.7	60	214.29 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Nabo (<i>Brassica napus</i>) Sacha quinua (<i>Chenopodium album L.</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>)	0.5 l/ha	N.A.	12

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación está en función de la presencia de las malezas; se recomienda efectuarla cuando las malezas tengan de dos a tres hojas verdaderas. Se recomienda efectuar una sola aplicación, de acuerdo a la planificación de cada finca.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Antes de utilizar **ALMAT** lea detenidamente la etiqueta; debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida al control de la maleza. Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de **ALMAT** a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas.

Volúmenes de mezcla recomendados:

En todos los cultivos se debe realizar una calibración de los equipos de aplicación a fin de determinar el gasto en relación con la fenología del cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con otros herbicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	19-04-2022	ECU