

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Gránulos Dispersables (WG)
REGISTRO NACIONAL N°:	2-H68/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 Kg, 25 Kg
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO ATENCIÓN 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Atrazine.....900 g/Kg Excipientes c.s.p.....1 Kg
MODO DE ACCIÓN:	KAIKET es un herbicida selectivo para los cultivos de maíz, sorgo, esparrago, piña y caña de azúcar, perteneciente al grupo de las triazinas, que controla eficazmente malezas gramíneas anuales, de hoja y ciperáceas.
MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa bloqueando la fotosíntesis, con la consecuente inhibición de la formación de almidón y energía, ocasionando una desecación y muerte de las malezas.

GRUPO QUÍMICO:	Triazinas		
CÓDIGO HRAC:	C1		
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Solubilidad	Presión de vapor	Punto de fusión
	70 mg/L a 20 °C	4×10^{-5} a 20 Pa	173 - 175 °C
	KoW	Densidad	PM
	2.61	1.2 (g/ml) a 20°C	215.69 kg/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Betilla lila (<i>Ipomoea indica</i>) Paja de burro (<i>Eleusine indica</i>)	2.0 Kg/ha	1	12

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

El producto **KAIKET** se debe aplicar en una sola ocasión entre 1 y 5 días de sembrado el cultivo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. Aplicarlo a la frecuencia recomendada. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. Colocar el producto en sus dosis procurando agitar bien, con el fin de disolver completamente el producto; luego se colocar en la bomba y completar el volumen de agua recomendado para la aplicación, continuar con la agitación hasta obtener una mezcla homogénea.

Volúmenes de mezcla recomendados:

200 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No hay materiales que sean específicamente mencionados. El producto KAIKET no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta. Tener en cuenta que es un herbicida y se debe evitar el contacto con cultivos no recomendados.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686 Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	25-03-2022	ECU