

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Gránulos dispersables (WG)
REGISTRO NACIONAL N°:	39 – H107/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	100 g, 1 kg, 25 kg
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA 4- LIGERAMENTE PELIGROSO ATENCIÓN 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Glyphosate ammonium salt.....757 g/Kg Excipientes c.s.p.....1 Kg
MODO DE ACCIÓN:	GLIXATO 757 es un herbicida sistémico, no selectivo, residual, de amplio espectro y control duradero sobre prácticamente todas las malezas: Gramíneas, Cyperaceas y de Hoja ancha tanto anual como perennes.
MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa inhibiendo a la enzima precursora de la formación de aminoácidos aromáticos.
GRUPO QUÍMICO:	Glicinas

CÓDIGO HRAC:	G		
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Solubilidad	Presión de vapor	pH
	620 g/L a 20 °C	1.94 ⁻⁷ mPa a 25°C	3 - 6
	KoW	Densidad	PM
	-4.22 pH 7.4	1.74 (g/ml)	275.2 kg/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Bordes de áreas agrícolas	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i> L.) Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i> L.) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Campanita (<i>Asystasia gangetica</i> L.)	1.5 kg/ha	N.A.	48

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan efectuar 1 sola aplicación. Aplicar en las malezas gramíneas y de hoja ancha ya establecidas y en plena floración.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla, previamente regular el pH y adicionar un adherente, luego verter la cantidad necesaria de Glixato 757 al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. No exceder dosis y volúmenes de aplicación.

Volúmenes de mezcla recomendados:

300 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No son conocidas incompatibilidades, sin embargo, no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad. No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con los cultivos.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686 Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	25-03-2022	ECU