


DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST – ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Concentrado Emulsionable (EC)
REGISTRO NACIONAL N°:	34 - H 8/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 1 3.8 L, 9.5 L, 200 L
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	<p>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO</p> <p>CUIDADO</p> 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	<p>Ingrediente activo:</p> <p>Pendimethalin.....400 g/L</p> <p>Solvent naphtha (Petroleum) heavy aromatic.....497 g/L</p> <p>Excipientes.....1 L</p>
MODO DE ACCIÓN:	PAROLI® es un herbicida selectivo y residual que se absorbe por la radícula y epicótilo. Puede aplicarse en preemergencia (incorporado) y pos-emergencia temprana contra malezas gramíneas anuales y algunas de hoja ancha.
MECANISMO DE ACCIÓN:	PAROLI® Actúa inhibiendo la división y elongación celular en los puntos de crecimiento o meristemas del tallo y las raíces
GRUPO QUÍMICO:	Dinitroanilina

CÓDIGO HRAC:	K1		
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	0.33 mg/l (20°C) (TC)	6 - 7	1.94 mPa (25 °C) (TC)
	K_{ow}	Densidad	PM
	5.2	1.06 g/cm ³ (20 °C)	281.3 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Cabazonillo (<i>Cyperus esculentus</i>) Paja de patillo (<i>Echinochloa colona</i>)	2.0 L/ha	*** N.A.	12
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) Guardarocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	2.0 l/ha	1 día	12

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Arroz: Se recomienda efectuar 1 sola aplicación, tres días después del trasplante del arroz, en el estado de preemergencia de las malezas.

Maíz: Se recomienda efectuar una sola aplicación por ciclo, 2 días después de la siembra, en preemergencia de las malezas y cultivo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla verter la cantidad necesaria de PAROLI® al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de aplicación terrestre.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Arroz: 360 litros/ha.

Maíz: 200 litros/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

PAROLI® es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

PAROLI® puede mezclarse con 2,4 D Amina e insecticidas piretroides como Shurigan. Si desea aplicar insecticidas a base de Carbaril y Bentiocarb luego de **PAROLI®**, espere 25 días. Si desea aplicar insecticidas fosforados luego de **PAROLI®** espere 8 días. Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo recomendado. Tener en cuenta que el producto es un herbicida, por lo tanto, evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:



ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX

1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	27-04-2022	ECU
Segunda	11-11-2022	ECU