

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
CLASE:	INSECTICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Concentrado Emulsionable (EC)
REGISTRO NACIONAL N°:	49-124/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	120ml, 250ml, 1L, 200L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Lambda-cyhalotrina.....50 g/L Cyclohexanone.....100 g/l Solvent naphtha, (petroleum), light aromatic.....659,50 gl Aditivos..... c.s.p. 1 l
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico y de contacto
MECANISMO DE ACCIÓN:	SEYDON® imidacloprid se ajusta a los receptores con la intención de recibir la acetilcolina, que lleva los impulsos nerviosos de una célula nerviosa a otra. Al bloquear estos receptores acetilcolina un exceso de acetilcolina se acumula causando parálisis y eventualmente la muerte.

GRUPO QUÍMICO:	Piretroides		
CÓDIGO IRAC:	3 ^a		
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	5 x 10 ⁻³ mg/L	4.0-7.0	1.5 x 10 ⁻⁹ mm Hg a 20 °C
	K_{ow}	Densidad	PM
	5.5 a pH 7, 20 °C	1.33 g/ml ³	449.85 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.20 l/ha	21	24

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una aplicación en fase de desarrollo vegetativo 30DDS. La aplicación del producto será dirigida sobre el follaje cubriendo todo el cultivo en forma homogénea.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Utilizando el equipo de protección adecuado, colocar el volumen de agua a emplearse en el respectivo recipiente, posteriormente agregar el coadyuvante a la dosis de 1ml por litro de agua, agitar y agregar la dosis del producto SEYDON.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Arroz: 200-400 litros de agua

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados. En caso de mezcla con productos en la que no se conozca su selectividad al cultivo y/o compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una prueba a

pequeña escala, antes de la aplicación comercial. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:



ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800

VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	12-11-2020	ECU
Segunda	04-05-2022	ECU