

PLAN DE MANEJO EN EL CULTIVO DE BANANO



Blanco Biológico		Fase Vegetativa	Inicio de Floración	Llenado de racimo	Post-Cosecha
ENFERMEDADES	Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)	NOMAD (Tebuconazole + Propiconazole) SANKOT (Difenoconazole) LUPUS (Epoconazole) FLUTRIOXIN (Azoxystrobin+ Futriafol) FUNGIS KHAN (Mancozeb) DACAPO (Clorothalonil) **Sulfato de cobre Pentahidratado RAINBOPYR (Pirimetaniil) INPUT 800 (Spiroxamina) FAITER (Tridemorf) ZZ 720 (Azufre)			
POSTCOSECHA	Pudrición de Corona				PRELUDE (Myclobuthanil)
PLAGAS	Cochinilla / Ceramidia	* MAXTRINE (Matrine)			
	Trips / Cochinilla / Ceramidia	* BUSHIDO (Pyriproxifen 100)			* SEIKEN (Spinosad)
MALEZAS	Gramíneas Pre emergencia	**Diuron			
	Varias malezas Post emergencia no selectivo	**Glyphosate ammonium salt			
		**Paraquat			
		**Glufosinato de amonio			

*En proceso de ampliación.

**Ingrediente activo registrado para control de Plagas pertenecientes a la misma familia, en otros cultivos.