DATOS GENERALES	
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	**AVGUST - ECUADOR S.A.** **Matriz Daule:** Avda. León Febres Cordero. Edificio Millenium Platinum 1 piso 07 oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (+593) 4 6061 360 **Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (+593) 2 6016 686
FORMULADOR:	**EASTCHEM CO., LTD.** Floor 26, Haoyuan Mansion, NO.266, Middle Tongjiang Road, Changzhou, Jiangsu, China Tel: 086-519-68786677
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Concentrado Soluble (SL)
REGISTRO NACIONAL N°:	13-H23/NA-CL2
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 l, 4l, 20 l
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 **CATEGORÍA 3 – MODERADAMENTE PELIGROSO** **PELIGRO**

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Glufosinate ammonium.....200 g/l Aditivos c.s.p.....1 l
MODO DE ACCIÓN:	Contacto, no selectivo con alguna acción sistémica
MECANISMO DE ACCIÓN:	Inhibidor de la glutamina sintetasa: acumula iones de amonio, inhibe la fotosíntesis.
GRUPO QUÍMICO:	**Phosphinic acid**
CÓDIFO HRAC:	**H**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad	pH	Solubilidad en agua
1.09 g/ml (20 °C)	6.4 (20 °C)	1,370 g/l (22 °C)
K_{ow}	**Presión de vapor**	**PM**
< 0.1 (ph 7)	$9.1x10^{-12}$ mm Hg (25 °C)	198.16 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Banano (*Musa acuminata* AAA)	Paja brava (*Paspalum paniculatum*) Bledo blanco (*Amaranthus dubius*) Tripa de pollo (*Drymaria cordata*) Pasto ilusión (*Panicum trichoides*)	1.5 l/ha	***N.A.	24

	Yerba de chivo (*Ageratum conyzoides*)			

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.
***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar GLUSSO una sola ocasión, ante la presencia de la maleza, cuando presente más de cinco hojas verdaderas.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua a 5.5-6.5. Verter la cantidad necesaria de GLUSSO al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

Volúmenes de mezcla recomendados:
200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
GLUSSO no es compatible con ácidos fuertes, bases u oxidantes, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física. No es fitotóxico a la dosis y forma de uso recomendados.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
DR. AGRO S.A. DORAGRO S.A. Teléfono: 2953 325 – Los Ríos.

Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	25-07-2024	ECU