FEDORA

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	**AVGUST - ECUADOR S.A.** **Matriz Daule:** Avda. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (+593) 4 6061360 **Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá. Of. 306. Cumbayá, Quito - Ecuador. Teléfono: (+593) 2 6016 686
FORMULADOR:	**SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.** 19th & 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No.7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL N°:	194-F9/NA-CL-2023-0112
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	250 ml, 500 ml, 750 ml, 1L, 1.5 L, 2.5 L, 1 GL, 2.5 GL y 200L
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Fluazinam.....500 g/l Kathon..... 3 g/l Aditivos c.s.p.....1 l
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida con acción protectora

MECANISMO DE ACCIÓN:	Desacopla la fosforilación oxidativa mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas, penetración de hifas, crecimiento y esporulación.
GRUPO QUÍMICO:	**Phenylpyridinamine**
CÓDIFO FRAC:	**Grupo 29**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidad	pH	Presión vapor
0,135 mg/l	7 -9	0,0172 Pa a 20°C
K_{ow}	**K_{oc}**	**PM**
4.87	16430	465,14 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Rosa (*Rosa* sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.75 l/ha	***N.A.	48

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.
***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Rosa: Aplicar con el aparecimiento de los primeros síntomas de la plaga, realizar dos aplicaciones con intervalo de seis (6) días, dependiendo de la presión de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Rosa: 1000 litros/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatibilidad con álcalis fuertes y ácidos fuertes. En caso de requerirse mezcla con otros productos, bajo responsabilidad del usuario, se recomienda hacer pruebas a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.
El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX
1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINOCHEMICAL S.A., Teléfono: 0992500795

Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	16-01-2025	ECU