

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07 oficina 702. Daule – Ecuador

Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.

Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

ACARICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Polvo Mojable (WP)

REGISTRO NACIONAL No.:

5 – A5/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 25 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Hexythiazox.....100 g/kg Excipientes c.s.p..... 1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Acaricida de contacto, con acción estomacal y translaminar.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Ovicida, larvicida y ninficida. No es activo frente a los adultos, pero los huevos puestos por las hembras tratadas son inviables.		
GRUPO QUÍMICO:	Carboxamidas		
CÓDIGO IRAC:	Grupo 10A		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	0.1 mg/l	6.0 – 8.0	1.33 X 10 ⁻⁰³ mPa a20 °C
	Kow	Koc	PM
	2.67	1100-6200	352.88 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Ácaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.50 g/l	No aplica	48 horas
		0.80 kg/ha		

Maíz (<i>Zea mays</i>)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.20 kg/ha	45 días	48 horas
-----------------------------	--	------------	---------	----------

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Rosa: Se recomiendan efectuar una sola aplicación por ciclo. Se aplica cuando hay de dos a tres formas móviles por foliolo.

Maíz: Efectuar una sola aplicación por ciclo, con la presencia de 5-6 formas móviles por hoja, en etapa fenológica vegetativa (prefloración)

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla, primero regular el pH del agua de aplicación a 5.5, luego verter la cantidad necesaria de Hexmite® al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. De ser necesario adicionar un coadyuvante (0.5 ml/l).

No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. No exceder dosis y volúmenes de aplicación.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Rosa: 1600 l/ha en producción.

Maíz: 400 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Hexmite® es incompatible con productos alcalinos. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.19-06-20226.VM