

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 4 6061 360 Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 2 6016 686
FORMULADO POR:	Shandong Rainbow International Co., Ltd. 30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101
CLASE:	ACARICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL No.:	3-A4/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	60 ml, 120 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 200 l
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	  CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO PELIGRO            

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Chlorfenapyr..... 240 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Throtaden es un acaricida sistémico, de contacto y principalmente de acción estomacal.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Throtaden actúa en el desacoplamiento en la mitocondria de la fosforilación oxidativa.		
GRUPO QUÍMICO:	Pirroles		
CÓDIGO IRAC:	Grupo 13		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	0.112 mg/l	5.0 - 9.0	9.81 x 10 ⁻⁰³ mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	5.21	10000	407.62 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Ácaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	500 ml/ha	No aplica	12 horas

Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Enrollador de la hoja (<i>Tuta absoluta</i>)	0.12 l/200 l	1 día	12 horas
--	---	--------------	-------	----------

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Rosa: Realizar una aplicación por ciclo de cultivo. Realizar la aplicación cuando exista la presencia mínima de 3-5 estados móviles de ácaros (adultos + ninfas) en una hoja.

Tomate riñón: Realizar una aplicación por ciclo de cultivo, cuando exista la presencia de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para su preparación en un recipiente adecuado con agua, bajar el pH a 5.5, aplicar dispersante para permitir una distribución homogénea, mezclar la dosis recomendada, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Rosa: 1500 l/ha

Tomate riñón: 600 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatible con plaguicidas fuertemente ácidos y alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono: 0992500795.



V1.19-06-2026.VM