

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

83-F17/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

1 l, 4 l, 20 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Pyrimethanil600 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Protectante con varias propiedades curativas.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Inhibe la síntesis de aminoácidos y proteínas, específicamente la inhibición de la biosíntesis de la metionina.		
GRUPO QUÍMICO:	Anilinopyrimidinas		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 9		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	110 mg/l	4.5 – 7.5	1.1 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	2.84	220 – 430	199.28 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.5 l/ha	0 días	4 horas

Rosas
(*Rosa sp.*)

Moho gris
(*Botrytis cinerea*)

0.75 ml/l

No aplica

12 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Se recomienda aplicar con el apareamiento de los primeros síntomas visibles de daño del patógeno; es decir con el umbral económico de piscas en estado -1, aplicándolo una vez por ciclo de cultivo.

Rosa: Se recomienda aplicar el producto por dos ocasiones en el cultivo de rosa en etapa de producción, con un umbral de 0.5 % daño por moho gris/botón.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para efectuar las aplicaciones se recomienda previamente calibrar la bomba de aplicación para determinar la cantidad de mezcla necesaria. Para la preparación de la mezcla se recomienda previamente regular el pH del agua y adicionar un adherente, luego diluir la cantidad de producto en 50 % del agua y agitar hasta conseguir un caldo homogéneo, luego completar el volumen de agua requerido y agitar, finalmente adicionar un adherente.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 80 l/ha

Rosa: 1200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes. No mezclar con productos que contengan aluminio o materiales orgánicos. En caso de dudas, se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.08-06-2026.VM