

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, oficina 306. Cumbayá, Quito - Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

122-F10/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

125 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA 4– LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Dimethomorph.....500 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico local con actividad protectante y anti-esporulante		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Curandero actúa por inhibición de la síntesis de celulosa, ocasionando rompimiento de las paredes celulares y finalmente causando la muerte del hongo oomiceto.		
GRUPO QUÍMICO:	Morfolinas		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 40		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	28.95 mg/l	7.3	9.7x10 ⁻⁴ mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	2.68	430	387.86 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5 l/ha	7 días	24 horas
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Mildiú veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	0.6 ml/l	No aplica	24 horas
		0.72 l/ha		

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Tomate riñón: Aplicar en la fase de prefloración y floración del cultivo, con la presencia de la enfermedad con un umbral económico de la plaga de 3 % de severidad en el follaje. Dirigir la aplicación a todo el follaje de la planta. Realizar una aplicación por ciclo.

Rosa: Se recomienda efectuar una sola aplicación por ciclo con el umbral de daño de <0.5 %.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previamente regular el pH del agua de aplicación a 5.5. Para preparar la mezcla se adicionó la cantidad de fungicida establecida al tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, agitar y completar el tanque con agua. Añadir el adherente de su preferencia. Aplicar procurando cubrir total y uniformemente toda la planta con el fin de obtener control sobre el blanco biológico.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Tomate riñón: 400 l/ha en floración.

Rosas: 1200 l/ha cultivo en floración.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común y puede combinarse con plaguicidas y fertilizantes de reacción neutra, también con inoculante. Es incompatible con compuestos de reacción alcalina.

Empleado bajo las condiciones descritas ninguna de las dosis aplicadas de Curandero, genera efectos fitotóxicos en el cultivo o en la flora y fauna del área experimental.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.08-06-2026.VM