

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 6061360 Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, oficina 306. Cumbayá, Quito - Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADOR:	CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED 301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL No.:	18-F23/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1 l, 9.5 l, 19 l, 20 l y 200 l
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	  CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO PELIGRO          

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Chlorothalonil.....720 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Contacto foliar no sistémico, con acción protectante.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa por medio de la conjugación y reducción de compuestos Tiol de células fúngicas germinativas, dando lugar a la interrupción de la glicólisis y producción de energía, fungi-estasis y acción fungicida.		
GRUPO QUÍMICO:	Cloronitrilos		
CÓDIGO FRAC:	Grupo Mo5		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	0.81 mg/l	5.0 – 7.0	0.076 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	2.94	2632	265.91 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.5 l/ha	1 día	4 horas

Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.4 l/ 200 l	7 días	4 horas
		1.2 l/ha		

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Se recomienda efectuar 2 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 7 días y con la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad.

Papa: Se recomienda efectuar dos aplicaciones con un intervalo de 7 días, con una incidencia de máximo 1 % de daño foliar, con el cultivo en estado fenológico pre-floración y floración.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua de aplicación a 6,5 y añadir coadyuvante. Para preparar la mezcla verter en un tanque con agua hasta la mitad de su capacidad, la cantidad establecida de Dacapo®, agitar y completar el tanque con agua. Aplicar procurando cubrir total y uniformemente toda la planta con el fin de obtener control sobre el blanco biológico. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/h. No exceder dosis y volúmenes de aplicación.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 60 l/ha

Papa: 600 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Dacapo® es incompatible con agentes oxidantes, ácidos y álcalis. No mezclar con aceite agrícola. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686-Quito.



V1.09-06-2026.VM