

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, oficina 306. Cumbayá, Quito- Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

SHARDA CROP CHEM LIMITED

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, India

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Gránulos Dispersables en Agua (WG)

REGISTRO NACIONAL No.:

143-F2/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

60 g, 100 g, 120 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Azoxystrobin.....200 g/kg Difenoconazole.....125 g/kg Excipientes c.s.p.....1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida con propiedades protectoras, curativas, erradicantes, translaminares y sistémicas.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Inhibe en la germinación de esporas y el crecimiento micelial y muestra actividad antiesporulante.		
GRUPO QUÍMICO:	Azoxystrobin: Estrobilurinas Difenoconazole: Triazoles		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 11 C3 + Grupo 3 G1		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Azoxystrobin:		
	Solubilidad	pH	Presión vapor
	6.7 mg/l	4.5 – 7.5	1.10×10^{-07} Pa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	2.5	589 ml/g	403.4 g/mol
	Difenoconazole:		
	Solubilidad	pH	Presión vapor
	15.0 mg/l	4.0 – 7.0	3.33×10^{-05} mPa a 20°C

	Kow	Koc	PM
	4.36	207	406.26 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.25 kg/ha	14 días	24 horas
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Mancha de asfalto (<i>Phyllachora maydis</i>)	0.25 kg/ha	30 días	24 horas
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Oídio (<i>Oidium</i> sp.)	1.25 kg/ha	No aplica	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Aplicar en dos ocasiones en presencia de la plaga en el cultivo, con intervalos de 7 días. Dirigir la aplicación hacia las partes aéreas de las plantas, de manera continua y uniforme mojando el área foliar.

Maíz: Aplicar en dos ocasiones en un intervalo de 7 días, cuando el cultivo está en crecimiento vegetativo 30 – 60 días de edad, cuando presenta un nivel de infección grado 2 (menor al 5 %).

Rosa: Aplicar en fase fenológica de floración como plaguicida sistémico y de contacto. Se recomienda realizar 2 aplicaciones con intervalos de 7 días.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Colocar agua hasta la mitad del tanque, agregar la cantidad recomendada de Difaz, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

Banano: Aplicar en emulsión agua aceite a dosis de 6 litros de aceite agrícola por hectárea y emulsificador 1 % del volumen de aceite usado, completar el volumen total con agua y agitar constantemente.

Maíz: Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación, lavar el equipo antes y después de su uso.

Rosa: Aplicar por aspersión a las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma homogénea.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 100 l/ha.

Maíz: 300 l/ha.

Rosa: 1500 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA. Teléfono: (02) 3330555-Quito.



V1.09-06-2026.VM