

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito- Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

11-F14/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

250 ml, 500 ml, 1 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Iprodione.....500 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida de contacto, con acción protectante y curativa.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio fúngico.		
GRUPO QUÍMICO:	Dicarboximidas		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 2		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	6.8 mg/l	6.0	5.1 x 10 ⁻⁰⁴ a 20 °C
	Kow	Koc	PM
	2.99	700	330.17 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.6 l/ha	1 día	12 horas

Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 ml/l	No aplica	12 horas
		2.4 l/ha		

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Tomate riñón: Efectuar la aplicación con la presencia de la plaga, con un 2 % de severidad. Dirigir la aplicación a todo el follaje de la planta. Realizar dos aplicaciones por ciclo, con un intervalo de 7 días.

Rosa: Efectuar una aplicación con el umbral de 0,5 % daño/botón en etapa de producción del cultivo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla, regular el pH del agua de aplicación a 5.5, adicionar la mitad de la cantidad de agua necesaria al tanque, dosificar la cantidad recomendada del fungicida, agitar hasta conseguir una mezcla homogénea, añadir el resto de agua necesaria y finalmente adicionar un coadyuvante (dosis 0.25 ml/l). Aplicar procurando cubrir total y uniformemente toda la planta con el fin de obtener control sobre el blanco biológico.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Tomate riñón: 400 l/ha en floración y cuaje de bayas.

Rosas: 1200 l/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No son conocidas incompatibilidades, sin embargo, no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

No es fitotóxico para los cultivos recomendados a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 Quito.



V1.10-06-2026.VM