

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Edificio Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 6061360 Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, oficina 306. Cumbayá, Quito – Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADO POR:	SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. 30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Líquido Miscible en Aceite (OL)
REGISTRO NACIONAL No.:	25-F16/NA-CL2
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 l, 4 l, 5 l, 20 l, 200 l
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II – MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo:		
	Tridemorph.....860 g/l		
	Aditivo de importancia toxicológica:		
	Solvent naphtha.....2 g/l		
MODO DE ACCIÓN:	Aditivos c.s.p.....1 l		
	Sistémico		
	Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, por inhibición de la reducción de esteroides e isomerización en la membrana celular de los hongos, deteniendo su desarrollo.		
	Morfolinas		
GRUPO QUÍMICO:	Grupo 5		
CÓDIGO FRAC:			
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	1.1 mg/l	6.0-9.0	12 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	4.2	2500 - 10000	297.52 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.5 l/ha	1 día	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Al inicio de los primeros síntomas y luego cada 14 días. Realizar 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla emulsión agua-aceite, colocar 6 litros de aceite agrícola/ha más el emulsificante al 1 %, adicionar la mitad de agua, luego agregar la dosis recomendada de Faiter y completar el volumen restante con agua. Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de este sea mayor a 10 km/hora. Evite derrames y volúmenes exagerados de escorrentía.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 90 l en mezcla total/ha (Aplicación terrestre). En aplicaciones áreas calibrar según vehículo utilizado.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Faiter es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes de uso agrícola. Es incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono: (02) 222 2575 / 0992500795 - Quito.



V1.10-06-2026.VM