

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero Ciudad Millenium, Edificio Platinum I, Piso 07, Oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá. Quito - Ecuador.
Teléfono: (02) 6016686

FORMULADOR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301, Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Polvo Mojable (WP)

REGISTRO NACIONAL No.:

13-F5/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

500 g, 1 kg, 25 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Fosetyl aluminium.....800 g/kg Excipientes c.s.p..... 1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Fozzy® es un fungicida sistémico del grupo de los Fosfonatos, que se absorbe a través de las hojas y raíces de las plantas, con translocación acropétala y basipétala. Actúa mediante la inhibición de la germinación de las esporas o bloqueando el desarrollo del micelio y la esporulación.		
GRUPO QUÍMICO:	Fosfonatos		
CÓDIGO FRAC:	Grupo Po7		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	111300 mg/l	3.0 – 4.0	1.00 X 10 ⁻⁰⁴ mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	- 0.70	0.1	354.10 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Mildiú vellosa (<i>Peronospora sparsa</i>)	2 g/l	No aplica	24 horas
		2.8 kg/ha		
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5 kg/200 l	3 días	24 horas
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	Mildiú (<i>Peronospora parasitica</i>)	1 kg/ha	3 días	24 horas
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Pudrición del cogollo (<i>Fusarium</i> sp.)	2 kg/ha	0 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Rosa: Se recomienda efectuar 2 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 5 días y con un 2 % de severidad.

Tomate riñón: Se recomienda efectuar 2 aplicaciones, con un intervalo de 7 días, con la presencia de la enfermedad con 3% severidad, en etapa reproductiva (floración y cuaje).

Brócoli: Efectuar 2 aplicaciones cada 5 días, con el umbral de 1 % de daño foliar, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo.

Piña: Realizar 2 aplicaciones en la fase fenológica desarrollo vegetativo del cultivo con intervalo de 7 días, con umbral de 1% incidencia.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Rosa: 1400 l/ha de rosas en producción

Tomate: 600 l/ha en etapa reproductiva.

Brócoli: 400 l/ha

Piña: 3000 l/ha

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Regular el pH del agua de aplicación a 6, luego verter la cantidad necesaria de Fozzy® al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. Adicionar coadyuvante a dosis de 0.25 ml/l agua. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. No exceder dosis y volúmenes de aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Juntos crecemos bien

Fozzy® es incompatible con ácidos fuertes y bases fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Empleados bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para los cultivos.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686-Quito.



V1.11-06-2026.VM