

DATOS GENERALES

AVGUST-ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium. Edificio Platinum. Piso 07. Oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

116-F10/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

1 l, 4 l, 10 l, 20 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4– LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Spiroxamine.....800 g/l		
	Aditivo de importancia toxicológica: Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic.....87.5 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico, con acción protectante, curativa y erradicante.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	INPUT 800 actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroides bioquímicos, principalmente por inhibición de la D-14 reductasa.		
GRUPO QUÍMICO:	Spiroketalamines		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 5		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	405 mg/l	5.0 – 9.0	9.7x10 ⁻³ mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	2.89	2415	297.5 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.4 l/ha	0 días	4 horas
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Oídio (<i>Oidium</i> sp.)	0.3 l/ha	No aplica	4 horas
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Oídio (<i>Oidium</i> sp.)	0.4 l/ha	3 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Aplicar en presencia de la plaga, en (2) dos ocasiones con un intervalo de 14 días.

Rosa: Se recomienda realizar una (1) aplicación en etapa de desarrollo vegetativo - producción, con un umbral de 0.5 severidad/hoja. Efectuar las aspersiones en las primeras horas de la mañana e incluir el producto en programas de MIPE.

Tomate riñón: Se recomienda realizar una (1) aplicación en etapa de desarrollo vegetativo - producción, con un umbral de 0.5 severidad/hoja. Efectuar las aspersiones en las primeras horas de la mañana e incluir el producto en programas de MIPE.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua a 5.5-6.5. Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de Input 800, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación. Para el cultivo de Tomate riñón se debe preparar el caldo de aspersión regulando el pH a 5.5 y añadiendo un coadyuvante a dosis de 0.25 ml/l de agua. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 80 l/ha (aplicación terrestre).

Rosa: 1500 l/ha

Tomate riñón: 400 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común y puede combinarse con plaguicidas y fertilizantes de reacción neutra, también con inoculante. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.11-06-2026.VM