

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.**Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360**Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No. 58, Nanhu Road, Nanjing 210017, China.

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

96 – F16 / NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

120 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 20 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO**

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Epoxiconazole.....125 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico, con acción protectante y curativa		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Lupus actúa en la inhibición de la C-14-desmetilasa en la biosíntesis de esteroides.		
GRUPO QUÍMICO:	Triazoles		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 3		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	7.1 mg/l	4.0 – 8.0	3.5×10^{-4} mPa (20°C)
	Kow	Koc	PM
	3.3	1440	329.76 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.75 l/ha	0 días	4 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar Lupus en banano cuando el cultivo se encuentre en estado vegetativo en etapa de producción. Se recomienda realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 7 días.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de Lupus. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 100 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es incompatible con ácidos y álcalis fuertes. En caso de dudas se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. No se evidencia problemas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SABAI Teléfono: (02) 2522028



V1.12-06-2026.VM