DATOS GENERALES	
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	**AVGUST - ECUADOR S.A.** **Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium, Edificio Platinum I,Piso 07, Oficina 702. Daule - Ecuador Teléfono: (04) 6061360 **Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADO POR:	**CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED** 301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Polvo Mojable (WP)
REGISTRO NACIONAL No.:	85 - F2/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	50 g, 100 g, 12,5 kg, 25 Kg
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 **CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO** **ATENCIÓN** 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	**Ingrediente activo:** Myclobutanil.....400 g/kg Excipientes c.s.p.....1 kg
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico, con acción protectante y curativa
MECANISMO DE ACCIÓN:	Prelude® Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol de las membranas celulares, deteniendo el desarrollo de los hongos. Además, actúa afectando el desarrollo de las hifas secundarias del patógeno dentro de los tejidos de la planta, sobre el desarrollo y la virulencia de las conidias de los hongos.
GRUPO QUÍMICO:	Triazoles
CÓDIGO FRAC:	Grupo 3 (G1)

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:

Solubilidad	pH	Presión de vapor
132 mg/l	6.0 – 8.0	0.198 mPa a 20 °C
Kow	**Koc**	**PM**
2.89	1400	288.78 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*)	**Oídio** (*Oidium* sp.)	0.10 kg/200 l 0.30 kg/ha	7 días	12 horas
Maíz (*Zea mays*)	**Tizón de la hoja** (*Helminthosporium maydis*)	0.05 kg/200 l 0.10 kg/ha	30 días	12 horas
Uva (*Vitis vinífera*)	**Oídio** (*Oidium* sp.)	0.25 kg/ha	14 días	12 horas
Banano (*Musa acuminata* AAA)	**Pudrición de la corona** (*Fusarium oxysporum*, *Verticillium* sp.)	0.38 g/l	No aplica	12 horas
Rosa (*Rosa* sp.)	**Oídio** (*Oidium* sp.)	0.40 g/l 0.48 kg/ha	No aplica	12 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Tomate riñón: Efectuar 2 aplicaciones, con una frecuencia de 14 días, con el umbral de 5% del área foliar afectada.
Maíz: Efectuar una aplicación con una severidad de 0.5 a 8% en etapa fenológica vegetativa.
Uva: Efectuar una aplicación en etapa de desarrollo vegetativo, dirigida al área foliar del cultivo.
Rosa: Efectuar una aplicación con una severidad de 0.5% del área foliar afectada, en etapa productiva del cultivo.
Banano: Aplicar por una ocasión en postcosecha, directamente a las coronas de los frutos de manera preventiva.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Para preparar la mezcla verter la cantidad necesaria de Prelude® al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de aplicación terrestre.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:
Tomate riñón: 600 l/ha en producción.
Maíz: 400 l/ha en prefloración.
Uva: 200 l/ha.
Rosa: 1200 l/ha.
Banano: No aplica (postcosecha)

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
Prelude® es incompatible con ácidos fuertes y bases fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito



V1.12-06-2025.VM