

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Edificio Platinum I. Piso 07, Oficina 702. Daule - Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000. Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

8-F27/NA-CL1

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 ml, 300 ml, 500 ml, 1 l, 1 gl, 2.5 gl, 10 l, 20 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Propiconazole.....250 g/l		
	Aditivo de importancia: Solvent Naphta (Petroleum).....618 g/l		
	Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico, con acción preventiva y curativa		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, evitando la formación de las membranas celulares de los hongos, lo que posteriormente les ocasiona la muerte.		
GRUPO QUÍMICO:	Triazoles		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 3		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	150 mg/l	5.0 – 7.0	0.056 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	3.72	1086	342.22 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.4 l/ha	1 días	12 horas
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Moho (<i>Penicillium</i> s.p.)	1 ml/l	No aplica	12 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Se recomienda efectuar dos aplicaciones por ciclo, a un intervalo de 14 días, con el aparecimiento de la enfermedad.

Piña: Se recomienda utilizar por una sola ocasión durante post-cosecha, el tiempo de exposición de la piña con la mezcla debe ir de 1 a 2 minutos.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 83 litros de mezcla/ha (6 l aceite/ha + 1 % emulsificante + resto de agua).

Piña: previa calibración

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Banano: Para preparar la mezcla se recomienda formar una emulsión agua-aceite, utilizando aceite (6 l/ha) adicionando emulsificante al 1% y completar el volumen de agua requerido (83 l/ha aproximadamente) para aplicaciones terrestres. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados.

Piña: La aplicación del producto Prozole, es durante la post cosecha, sumergiendo la piña en la preparación (inmersión), de acuerdo a la dosis recomendada. Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua. Verter la cantidad necesaria de Prozole al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad y agitar bien. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Prozole es incompatible con agentes oxidantes fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. No es fitotóxico para los cultivos recomendados a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINO-CHEMICAL S.A. 0992500795



V1.15-06-2026.VM