

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium. Edificio Platinum I. Piso 07, Oficina 702. Daule – Ecuador

Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.

Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301, Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu -China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

67 -F14/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 100 l, 200 l, 1000 l.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO PELIGRO



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Difenoconazole.....250 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico con acción preventiva y curativa, con amplio espectro de actividad.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Sankot® actúa como inhibidor de la síntesis del ergosterol. Su alta sistemía le permite una rápida penetración y movimiento en el tejido vegetal en donde se distribuye uniformemente.		
GRUPO QUÍMICO:	Triazoles		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 3		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	15 mg/l	5.0 – 7.5	3.33×10^{-05} mPa a (20 °C)
	Kow	Koc	PM
	4.36	5000 ml/g	406.26 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	0.4 l/ha	0 días	4 horas

Papa
(*Solanum tuberosum*)

Tizón temprano
(*Alternaria solani*)

0.20 l/ha

7 días

4 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Iniciar las aplicaciones con el apareamiento de la enfermedad. Se recomienda efectuar aplicaciones cada 14 días, un máximo de 3 aplicaciones por año.

Papa: Realizar una aplicación cuando la plaga presente un umbral económico del 2 – 5 %.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua y adicione la cantidad a aplicar según la dosis recomendada, agite y complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla. En caso de utilizar un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar. Sankot® debe aplicarse por vía terrestre o aérea; siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de Manejo Integrado de Enfermedades.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 40 l/ha (aplicación aérea); 55 l/ha (aplicación terrestre).

Papa: 400 l/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

El producto se puede aplicar en mezclas de tanque con otros plaguicidas, sin embargo, la mezcla se debe comprobar la compatibilidad de los componentes antes de aplicar. El producto no debe mezclarse con plaguicidas que tienen reacción fuertemente ácida o muy alcalina. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 – Quito.



V1.15-06-2026.VM