

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium. Edificio Platinum I. Piso 07, Oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

SHARDA CROPChem LIMITED

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), MUMBAI – 400056, India.
Teléfono: (+ 91) 22 6261 5615

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Polvo Mojable (WP)

REGISTRO NACIONAL No.:

33-F19/NA-CL1

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Thiophanate - methyl.....700 g/kg Excipientes c.s.p.....1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida sistémico con acción protectora y curativa. Su absorción lo realiza por las hojas y las raíces. Precursor de carbendazim.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Shartop reducirá los niveles de micotoxinas en el cultivo de forma independiente. Actuará como inhibidor de la mitosis y división celular (acoplamiento de la beta-tubulina en la mitosis).		
GRUPO QUÍMICO:	Benzimidazol		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 1		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	18.5 mg/l	4.0 -7.0	9.0×10^{-03} mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	1.4	200 – 600	342.39 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.40 kg/ha	1 día	12 horas
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Pudrición negra del fruto (<i>Fusarium sp.</i>)	0.40 kg/ha	14 días	12 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Tomate riñón: Realizar dos (2) aplicaciones al follaje del cultivo de tomate establecido, verificando previamente la presencia de la plaga.

Piña: Realizar dos (2) aplicaciones dirigidas a la planta en drench, el cultivo debe encontrarse en la etapa de crecimiento vegetativo, se debe constatar presencia de la plaga de hasta el 2 %.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de Shartop, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

Tomate riñón: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de Shartop, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

Piña: La aplicación se debe dirigir a la planta en drench, previo a la preparación de la mezcla, regular pH del agua y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea y luego verter esta mezcla en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Tomate riñón: 200 l/ha

Piña: 1500 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con otros fungicidas, excepto con ácidos fuertes y álcalis, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA. Teléfono: (02) 3330555 - Quito



V1.15-06-2026.VM