

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST-ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium, Edificio Platinum I, Piso 07, Oficina 702. Daule - Ecuador
Teléfono: (04) 6061 360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

47-F12/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

500 ml, 1 l, 4 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4- LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Captan..... 480 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida de contacto, con acción preventiva, curativa y multisitio.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Talos actúa interviniendo el proceso de respiración celular en los hongos, inhibiendo la germinación de las esporas y dificultando el crecimiento y desarrollo micelar. Reacciona con las enzimas sulfhídricas con producción de tiofosgeno, sustancia tóxica para las células fúngicas, e interfiere el proceso de respiración celular en los hongos por lo que inhibe la germinación de las esporas y dificulta el crecimiento y desarrollo micelar.		
GRUPO QUÍMICO:	Ftalimida clorado		
CÓDIGO FRAC:	Grupo Mo ₄		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	5.2 mg/l	3.0 – 6.0	0.41 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	2.5	200	300.61 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.5 l/ha	1 día	24 horas
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 ml/l	No aplica	24 horas
		1.8 l/ha		

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Tomate riñón: Aplicar en la fase floración y cuaje de bayas, con dos aplicaciones cada 7 días.

Rosa: Efectuar una aplicación con un umbral de daño de < 0.5 % daño/botón o de manera preventiva.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se debe regular el pH a 5.5. Para preparar la mezcla se debe colocar la mitad de agua en el depósito, después añadir Talos según recomendación, agitar; agregar el resto de agua y agregar un adherente (a dosis de 0.25 ml/l), finalmente agitar hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar el mismo día.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Tomate riñón: 1200 l/ha, cultivo en floración.

Rosas: 1200 l/ha, cultivo en producción

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No es compatible con productos extremadamente alcalinos, se recomienda sin embargo realizar pruebas de compatibilidad previa aplicación. Talos no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.16-06-2026.VM