

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.

Matriz Quito: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Edificio Platinum I. Piso 07, Oficina 702. Daule - Ecuador
Teléfono: (04) 6061 360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FROMULADO POR:

ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima – Perú

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

REGISTRO NACIONAL No.:

69-F15/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4-LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Copper sulphate pentahydrate.....365 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Vacun Q es un fungicida foliar con acción preventiva.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	El ión cobre-II (Cu ++) es absorbido por las esporas durante la germinación y se acumula hasta que se alcanza una concentración suficientemente alta para matar la célula de esporas; la actividad se limita a la prevención de la germinación de las esporas.		
GRUPO QUÍMICO:	Compuesto inorgánico		
CÓDIGO FRAC:	Grupo Mo1		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	100 mg/ml a 70 °F	5.13	Nula
	Kow	Koc	PM
	-6.8	No aplica	249,69 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1 l/ha	7 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar dos ocasiones con una frecuencia de 7 días, cuando el cultivo se encuentre en la fase de crecimiento y prefloración o desarrollo vegetativo, aplicar en presencia de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad, agregar el agroquímico evitando derrames o salpicaduras y comenzar la agitación, luego agregar correctores de pH, secuestrantes en caso de ser necesarios. Completar el llenado del equipo con agua faltante y continuar la agitación hasta el final de la pulverización. Aplicar aspergeando uniformemente cubriendo el total del área del cultivo, vía foliar, utilizando una bomba de mochila.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Arroz: 233 l/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas exceptuando los de marcada reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SOLVESA ECUADOR S.A. Teléfono: (04) 3704040



V1.16-06-2026.VM