

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST-ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Edificio Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

152-F6/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

1 l, 4 l, 5 l, 20 l, 60 l y 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo:		
	Fenpropidin.....750 g/l		
	Aditivo de importancia toxicológica:		
	Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic..... 202 g/l		
	Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico con acción curativa y protectora.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Voin es un fungicida que actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, evitando la formación de las membranas celulares de los hongos, lo que posteriormente les ocasiona la muerte.		
GRUPO QUÍMICO:	Piperidinas		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 5		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	530 mg/l	6.0 – 7.0	1.7x10 ⁻² mPa a 25°C
	Kow	Koc	PM
	2.9	71790	273.46 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.60 l/ha	0 días	4 horas
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Oídio (<i>Oidium</i> sp.)	0.36 l/ha	No aplica	4 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Efectuar la aplicación una sola vez por ciclo del cultivo, con el aparecimiento de los primeros síntomas visibles del patógeno (pizca grado 1).

Rosa: Efectuar una sola aplicación en etapa de producción con un umbral de 0.5 % daño/hoja compuesta.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Banano: previa calibración del equipo, en un balde colocar aceite agrícola y adicionar un emulsificante en proporción al 1 % de la cantidad de aceite a utilizar y mezclar por 5 min, colocar el fungicida en la dosis establecida procurando agitar bien, completar el volumen requerido con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

Rosa: Para preparar la mezcla, colocar el 50 % de agua en el balde, luego medir el pH inicial del agua (6,5); agregar el fungicida en las dosis establecidas, regular el pH del agua a 5,5 y completar la cantidad de agua agitando hasta conseguir una mezcla uniforme.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 80 l/ha

Rosa: 1200 l/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No se conocen incompatibilidades de uso. Se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. Aplicado a las dosis recomendadas y bajo condiciones normales no presenta riesgo de fitotoxicidad para los cultivos.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.16-06-2026.VM