

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE

CHEMICAL CO.LTD. 9th floor, No-58, Nanhu Road, Nanjing 210017, China.

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

15H-30/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 ml, 120 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3.8 l, 19 l, 20 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4- LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Ametryn.....500 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Herbicida selectivo sistémico.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Es absorbido principalmente por follaje y por raíces con traslocación acrópeta vía xilema y acumulación en los meristemos apicales. Inhibidor del transporte de electrones fotosintética en el sitio receptor fotosistema II.		
GRUPO QUÍMICO:	Triazinas		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 5		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	200 mg/l	5.0 – 9.0	0.365 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	2.63	388	227.12 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>)	3 l/ha	No aplica	48 horas
	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>)			
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>)	4 l/ha	No aplica	48 horas
	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>)			
	Paja de burro (<i>Eleusine indica</i>)			
	Lechosa (<i>Euphorbia nutans</i>)			
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	4 l/ha	83 días	48 horas
	Paja de burro (<i>Eleusine indica</i>)			
	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación debe dirigirse al área foliar de las malezas y al suelo.

Banano: Se recomienda, una aplicación post emergencia temprana de las malezas.

Caña de azúcar: Se recomienda una aplicación en pre o post emergencia temprana de las malezas.

Piña: aplicar cuando las malezas se encuentren en fase de post emergencia temprana y activo crecimiento (3-6 hojas) y cuando el cultivo se encuentre en fase de desarrollo vegetativo (2 meses después de la siembra).

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previo a la aplicación, se recomienda regular el pH del agua de aplicación a 5.5 y adicionar un coadyuvante a dosis de 0.25 ml/l de agua. Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de Cañaveral. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 300 l/ha

Caña de azúcar: 400 l/ha

Piña: 2000 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evitar el contacto con oxidantes fuertes: ácidos y bases. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.30-06-2026.VM