

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.**Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360**Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu - China

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

REGISTRO NACIONAL No.:

30 – H 3/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

1 l, 200 l, 1000 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Bentazone.....480 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Cokifin es un herbicida que actúa por contacto, post-emergente y selectivo.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Cokifin es absorbido por el follaje y actúa afectando la fotosíntesis (fotosistema II), inhibiendo la reacción de Hill y bloqueando el metabolismo de CO ₂ , deteniendo así la producción de ATP, desencadenando procesos de peroxidación de los lípidos, desecando las plantas.		
GRUPO QUÍMICO:	Benzotiazinonas		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 6		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	7112 mg/l	5.0 – 9.0	0.17 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	-0.46	2.40	240.3 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	1.5 l/ha	60 días	24 horas
	Cortadera (<i>Cyperus iria</i>)			
	Cyperus atractivo (<i>Cyperus virens</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el herbicida cuando el arroz tenga una edad entre 25-30 días después de la siembra (DDS). Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua y adicione la cantidad a aplicar según las dosis de Cokifin® recomendadas, agite y complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla. Aplicar uniformemente al follaje de las plantas. No debe aplicarse en contra del viento, ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Arroz: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No son conocidas incompatibilidades, sin embargo, no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala. Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.30-06-2026.VM