

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST – ECUADOR S.A. Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 6061360 Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADO POR:	CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED 301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu - China
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Concentrado Emulsionable (EC)
REGISTRO NACIONAL No.:	64-H16/NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	250 ml, 1 l, 200 l
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO ATENCIÓN 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Clethodim.....240 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Herbicida con acción sistémica, se absorbe rápidamente y se traslada fácilmente del follaje tratado al sistema radicular y partes en crecimiento de la planta.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Finan® actúa inhibiendo la enzima Acetil-CoA Carboxilasa (ACCase). Actúa interrumpiendo la biosíntesis de lípidos y ácidos grasos esenciales para las membranas celulares en el tejido de crecimiento de las gramíneas.		
GRUPO QUÍMICO:	Ciclohexanodionas		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 1		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	5450 mg/l	5.0 – 9.0	2.68x10 ⁻⁰² mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	1.50	42	359.92 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	Paja virgen (<i>Cynodon dactylon</i>)	1 l/ha	No aplica	24 horas
	Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>)			
	Pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando las malezas tengan entre 3 a 5 hojas verdaderas. Dirigir la aplicación a todo el follaje de la maleza. Realizar una sola aplicación.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previamente regular el pH del agua de aplicación a 6. Para preparar la mezcla adicionar la cantidad de herbicida establecida al tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, agitar y completar el tanque con agua. Mantenga la mezcla en constante agitación. Aplicar procurando cubrir total y uniformemente toda la maleza. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/h.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Palma africana: 400 l/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Finan® Es compatible con muchos pesticidas del mismo grupo químico, y con muchos fertilizantes, cuando es usado en las dosis recomendadas.

El producto mezclado con herbicidas para el control de hojas anchas, puede disminuir su actividad de control. Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.30-06-2026.VM