

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador

Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.

Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000. Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Gránulos Dispersables en Agua (WG)

REGISTRO NACIONAL No.:

39 – H107/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 g, 1 kg, 25 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4- LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Glyphosate ammonium salt.....757 g/kg Excipientes c.s.p.....1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Glixato 757 es un herbicida no selectivo de amplio espectro y post-emergencia con una alta sistemisidad. Se absorbe a través de las hojas y partes verdes de la maleza, translocándose por el floema hacia los órganos subterráneos y los puntos de crecimiento activo, donde se acumula para destruir por completo la estructura de la planta.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa inhibiendo a la enzima EPSP sintasa, bloqueando la vía metabólica del ácido shiquímico. Esta interrupción impide que la planta sintetice los aminoácidos aromáticos esenciales, deteniendo la producción de proteínas y provocando un colapso celular y metabólico generalizado en la maleza.		
GRUPO QUÍMICO:	Glicinas		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 9		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	500000 mg/l	4.0 - 5.0	1.3×10^{-5} mPa a 25°C
	Kow	Koc	PM
	-3.2	8000 – 24000	198.2 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Bordes de áreas agrícolas	Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i> , <i>Rottboelliacochinchinensis</i>)	1.5 kg/ha	No aplica	48 horas
	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)			
	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)			
	Campanita (<i>Asystasia gangetica</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan efectuar 1 sola aplicación. Aplicar en las malezas gramíneas y de hoja ancha ya establecidas y en plena floración.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla, previamente regular el pH y adicionar un adherente, luego verter la cantidad necesaria de Glixato 757 al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. No exceder dosis y volúmenes de aplicación.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Bordes de áreas agrícolas: 300 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No son conocidas incompatibilidades, sin embargo, no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con los cultivos.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.30-06-2026.VM