

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

NANJIG ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No. 58, Nanhu Road, Nanjig 210017, China

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

197-H2/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 ml, 120 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN:	Ingrediente activo: Haloxifyfop-R-methyl.....108 g/l Aditivo de importancia toxicológica: Xylene.....622 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Haloxisen® es un herbicida sistémico, selectivo y post-emergente, se absorbe por las hojas y se trasloca rápidamente hacia los meristemos y raíces de las gramíneas.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Haloxisen® inhibe la enzima Acetil-CoA Carboxilasa (ACCase), bloqueando por completo la síntesis de ácidos grasos. Al no poder formar membranas celulares nuevas, el crecimiento se detiene y los tejidos meristemáticos se necrosan, eliminando la maleza desde la raíz.		
GRUPO QUÍMICO:	Aryloxyphenoxypropinate		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 1		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	7.9 mg/l	4.0 – 7.0	0.055 mPa a 20 °C
	Kow	Koc	PM
	4.0	2000 - 5000	375.7 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	Paja caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	0.35 l/ha	No aplica	24 horas
	Paja de burro (<i>Eleusine indica</i>)	0.15 l/ha		

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Palma africana: Se recomienda aplicar cuando las malezas se encuentren en estado fenológico de emergencia, observándose de una a tres hojas verdaderas, se debe realizar una aplicación antes de que aparezca la fruta o después de la aparición de malezas en 2-4, 3-5 o 4-6 hojas respectivamente (BF y PE).

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de Haloxisen. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Llevar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Palma africana: 300 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Haloxisen® es incompatible con agentes oxidantes fuertes. No se evidencia problemas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SABAI Teléfono 0984054518



V1.30-06-2026.VM