

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu - China

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Gránulos Dispersables en Agua (WG)

REGISTRO NACIONAL No.:

2-H68/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

500 g, 900 g, 1 kg, 25 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Atrazine.....900 g/kg Excipientes c.s.p.....1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Kaiket es un herbicida sistémico selectivo, absorbido a través de las raíces y follaje, con translocación acropétala en el xilema y acumulación en los meristemas y hojas apicales; controla eficazmente malezas gramíneas anuales, de hoja ancha y ciperáceas.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa bloqueando la fotosíntesis, con la consecuente inhibición de la formación de almidón y energía, ocasionando una desecación y muerte de las malezas.		
GRUPO QUÍMICO:	Triazinas		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 5		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	35 mg/l	5.0 – 7.0	0.039 mPa a 20 °C
	Kow	Koc	PM
	2.7	100 – 300	215.68 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	2 kg/ha	1 día	24 horas
	Betilla (<i>Ipomoea hirta</i>)			
	Botoncillo (<i>Caperonia palustris</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El producto Kaiket se debe aplicar en una sola ocasión entre 1 y 5 días de sembrado el cultivo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. Aplicarlo a la frecuencia recomendada. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. Colocar el producto en sus dosis procurando agitar bien, con el fin de disolver completamente el producto; luego colocar en la bomba y completar el volumen de agua recomendado para la aplicación, continuar con la agitación hasta obtener una mezcla homogénea.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Maíz: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No son conocidas incompatibilidades, sin embargo, no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

El producto Kaiket no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta. Tener en cuenta que es un herbicida y se debe evitar el contacto con cultivos no recomendados.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.01-07-2026.VM