

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu - China

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

REGISTRO NACIONAL No.:

7 – H49/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

500 ml, 1 l, 3.8 l, 9.5 l, 19 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 3 – MODERADAMENTE PELIGROSO
PELIGRO



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Paraquat dichloride.....276 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Ogon® es un herbicida con acción de contacto no selectivo, absorbido por el follaje, con alguna traslocación en el xilema.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Durante la fotosíntesis, genera superóxido, que daña las membranas celulares y el citoplasma.		
GRUPO QUÍMICO:	Bipiridilos		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 22		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	620000 mg/l	2.0 – 6.0	0.01 mPa a 25°C
	Kow	Koc	PM
	-4.5	1000000	275.16 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Bordes de áreas agrícolas	Caminadora (<i>Rottboellia cochinensis</i>)	3 l/ha	No aplica	48 horas
	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)			
	Escoba de monte (<i>Sida rhombifolia</i>)			
	Campanita (<i>Asystasia gangetica</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando está en activo crecimiento 5 - 10 cm de altura. Se debe realizar un 100 % de cobertura del suelo en bordes de áreas agrícolas. Realizar una aplicación por ciclo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla adicionar la cantidad de herbicida establecida al tanque hasta la mitad de su capacidad con agua en constante agitación, adicionar un coadyuvante a dosis recomendadas, agitar y completar el tanque con agua. Aplicar procurando cubrir total y uniformemente todas las malezas con el fin de obtener control sobre el blanco biológico.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Bordes de áreas agrícolas: 300 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No son conocidas incompatibilidades, sin embargo, no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad. Empleado bajo las condiciones descritas no presentó fitotoxicidad para los cultivos aledaños.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.01-07-2026.VM