

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

REGISTRO NACIONAL No.:

66-H16/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

250 ml, 500 ml, 1 l, 3.8 l, 9.5 l, 19 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4– LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingredientes activos: 2, 4-D.....240 g/l Picloram.....64 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Pascer es un herbicida selectivo sistémico pre y pos-emergente sistémico, selectivo para arroz, maíz, caña de azúcar y potreros, eficaz para el combate de malezas de hoja ancha.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Pascer Actúa como un inhibidor del crecimiento, absorbido rápidamente por las raíces y las hojas, y translocado tanto acropetalmente como basipetalmente, acumulándose en un nuevo crecimiento. Actúa en la auxina sintética (que actúa como ácido indolacético).		
GRUPO QUÍMICO:	2, 4 -D: Ácido ariloxialcanoico Picloram: Piridinas		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 4 + Grupo 4		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	2, 4-D:		
	Solubilidad	pH	Presión vapor
	24300 mg/l	6.6	0.009 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	-0.82	39.3	221.04 g/mol
	Picloram:		
	Solubilidad	pH	Presión vapor
	488 mg/l	6.6	2.0x10 ⁻³ mPa 25°C

	Kow	Koc	PM
	-1.92	13	221.4 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Bordes de áreas agrícolas	Campanita (<i>Asystasia gangetica</i>)	2 l/ha	No aplica	48 horas
	Escoba (<i>Sida rhombifolia</i>)			
	Achochilla (<i>Momordica charantia</i>)			
	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)			
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Malva (<i>Sida acuta</i>)	1 l/ha	20 días	48 horas
	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>)			
	Oreja de ratón (<i>Centella asiatica</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Bordes de áreas agrícolas: El producto debe aplicarse por 1 sola ocasión en Bordes de Áreas Agrícolas para el control de malezas de hoja ancha ya establecidas en plena floración.

Caña de azúcar: se debe aplicar una vez por ciclo de cultivo, aplicando en fase fenológica de desarrollo vegetativo, cuando las malezas tengan de dos a tres hojas verdaderas.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previamente regular el pH del agua de aplicación a 5.5 - 6. Para preparar la mezcla se debe adicionar la cantidad dosificada del herbicida al tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua, después agitar y completar el volumen del tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla. Se debe aplicar procurando cubrir total y uniformemente

toda la maleza. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Bordes de áreas agrícolas: 300 l/ha

Caña: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No son conocidas incompatibilidades, sin embargo, no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.01-07-2026.VM