

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000. Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

REGISTRO NACIONAL No.:

73 - H 11/NA – CL4

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

250 ml, 500 ml, 1 l, 3.8 l, 9.5 l, 19 l, 20 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Imazethapyr.....100 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sayonara® es un herbicida sistémico, selectivo pos-emergente que controla malezas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales en cultivos de Soya, Frejol y Maní.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Sayonara® actúa inhibiendo la enzima sintetasa del ácido acetohidróxido (AHAS) una enzima clave en la biosíntesis de la cadena ramificada de aminoácidos como isoleucina, leucina y valina.		
GRUPO QUÍMICO:	Imidazolinonas		
CÓDIGO HRAC:	Grupo B		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	1400 mg/l	5.0 -7.0	1.33 x10 ⁻² mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	1.49	30 – 100	289.33 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Soya (<i>Glycine max</i>)	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>)	0.75 l/ha	30 días	12 horas
	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)			
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)			
Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	0.75 l/ha	60 días	12 horas
	Malva silvestre (<i>Fuertesimalva limensis</i>)			
	Falsa quinua (<i>Chenopodium album</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Soya: Aplicar en emergencia temprana de las malezas, con 2-4 hojas; realizar una sola aplicación, 15 días después de la siembra.

Arveja: Aplicar en post emergencia temprana de las malezas, con 3 a 5 hojas; realizar una sola aplicación a los 15 – 20 días, antes del apareamiento de los zarcillos.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua a 5. Verter la cantidad de Sayonara® en la mitad del volumen de agua necesaria y agitar lo suficiente hasta lograr una mezcla homogénea, completar la cantidad de agua requerida. Mantener la mezcla en constante agitación y asperjarla el mismo día de preparada. Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de aplicación terrestre. Procuren un cubrimiento total y uniforme. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/h.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Soya y Arveja: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Sayonara® es compatible con la mayoría de piretroides de uso común, así como con acetochlor, alachlor, metazachlor y metolachlor. Incompatible con oxidantes fuertes, materiales alcalinos, surfactantes y materiales inertes que contengan arcilla. En caso de dudas realizar una prueba preliminar en pequeña escala.

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo. Tener en cuenta que es un herbicida y como tal puede tener reacciones adversas en los tejidos vegetales. Manejarse con precaución para los cultivos no recomendados y sensibles.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono: 0992500795 - Quito.



V1.02-07-2026.VM