

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu - China

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

90-H26/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 ml, 1 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Bispyribac sodium400 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Solbis® es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente que puede ser absorbido por las hojas y raíces, recomendado para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en el cultivo de arroz.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Solbis® actúa inhibiendo la acetolactato sintasa (ALS) en la síntesis de aminoácidos (valina, leucina, isoleucina), ocasionando una interrupción de la división celular y crecimiento en plantas sensibles		
GRUPO QUÍMICO:	Pirimidiniloxibenzoatos		
CÓDIGO HRAC:	Grupo 2		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	64000 mg/l	6.0 - 9.0	5.50×10^{-06} mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	-1.03	852 – 1793	452.4 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>)	0.075 l/ha	No aplica	24 horas
	Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>)			
	Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>)			
	Cabazonillo (<i>Cyperus ferax</i>)			

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda efectuar una aplicación por ciclo, en emergencia temprana de las malezas (1-3 hojas), después del trasplante (alrededor de 6 días).

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla se recomienda adicionar la dosis de producto recomendada en agua, mantener en constante agitación, y asperjar uniformemente sobre el cultivo y las malezas. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. Evite derrames y generar volúmenes exagerados de escorrentía.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Arroz: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Solbis® es compatible con los herbicidas utilizados comúnmente en el cultivo de arroz, tales como Clomazone y Quinclorac. Puede ser aplicado con la mayoría de los insecticidas. No aplicar junto con propanil. En caso de dudas se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación. Tener en cuenta que el producto es un herbicida y se debe evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.02-07-2026.VM