

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador

Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.

Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu - China

CLASE:

INSECTICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

12 – I18/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 200 l.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II – MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo:		
	Dimethoate..... 400 g/l		
	Aditivo de importancia toxicológica:		
	Xylene.....475.46 g/l		
	Aditivos c.s.p..... 1l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico, con acción por contacto y estomacal.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Diabolo® actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa, ocasionando disturbios en el sistema nervioso de los insectos, a través de una hiper-actividad nerviosa, que le ocasionan la muerte.		
GRUPO QUÍMICO:	Organofosforados		
CÓDIGO IRAC:	Grupo 1B		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	25900 mg/l	6.5	2.5 mPa a 20 °C
	Kow	Koc	PM
	0.75	20 – 40	229.26 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	Pulgón (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.60 l/ha	14 días	24 horas

Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Chinche de la espiga (<i>Oebalus ornatus</i>)	0.40 l/ha	15 días	24 horas
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Sinfilidos (<i>Hanseniella</i> sp.)	3 l/ha	15 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Brócoli: Con la aparición de los primeros insectos.

Arroz: Aplicar con daño foliar superior al 10 %. Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.

Piña: Efectuar una sola aplicación en etapa de desarrollo vegetativo temprano del cultivo en base al monitoreo de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua a 4 y adicionar un adherente. Verter la cantidad dosificada de producto al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad y agite. Complete el volumen de agua del tanque y agite hasta formar una mezcla homogénea.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Brócoli, Arroz y Piña: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No existen incompatibilidades conocidas. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. Empleado bajo las condiciones recomendadas a las dosis recomendadas no es fitotóxico.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.18-06-2026.VM