

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu - China

CLASE:

INSECTICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

6-I-59/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4– LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Cypermethrin..... 200 g/l Aditivos c.s.p..... 1l		
MODO DE ACCIÓN:	Inaecticida no sistémico, de contacto e ingestión.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Shurigan® actúa sobre el sistema nervioso de los insectos y perturba la función de las neuronas por interacción con el canal del sodio.		
GRUPO QUÍMICO:	Piretroides		
CÓDIGO IRAC:	Grupo 3A		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	0.009 mg/l	4.0 – 6.0	6.78x10 ⁻⁰³ mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	5.55	5.0x10 ⁴ – 1.5x10 ⁵	416.3 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pulguilla (<i>Epitrix cucumeris</i>)	0.20 l/ha	7 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Con el apareamiento de la plaga realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previo a la aplicación de la mezcla, regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del insecticida Shurigan en la mitad del volumen requerido de agua, mezcle y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Papa: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Shurigan® es compatible con la mayoría de insecticidas de uso común. No es compatible con productos de reacción alcalina. En caso de dudas se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.23-06-2026.VM