

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

JSC AUGUST, INC.

Tsentralnaya Street, 20A, 142432 Chernogolovka – Rusia

CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED

301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu – China

CLASE:

INSECTICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

68 - I 24 / NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 ml, 150 ml, 500 ml, 1l, 5 l, 10 l, 50 l, 200 l, 1000 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Imidacloprid.....500 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico y contacto, con acción por ingestión		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Tabu actúa como agonista sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina del sistema nervioso central, primero estimulando las membranas pos-sinápticas y después paralizando la conducción nerviosa.		
GRUPO QUÍMICO:	Neonicotinoides		
CÓDIGO IRAC:	Grupo 4A		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	610 mg/l	4.0 – 9.0	4.0X10 ⁻⁷ mPa a 20 °C
	Kow	Koc	PM
	0.57	156 – 300	255.66 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	3.3 ml/kg semilla	No aplica	24 horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	3.5 ml/kg semilla	No aplica	24 horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Tagasodes orizicolus</i>)	0.20 l/ha	30 días	24 horas
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.20 l/ha	7 días	24 horas
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Cochinilla harinosa (<i>Dysmicoccus brevipes</i>)	0.40 l/ha	75 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Vía foliar se recomienda efectuar una aplicación por ciclo al observar la presencia del insecto o dependiendo de la presión de la plaga, aplicar cuando el nivel de la misma alcance un nivel de daño económico y las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de los insectos plagas. Rotar con productos que posean mecanismos de acción diferentes para el control de la plaga y considerar un Manejo Integrado de Plagas (MIP). Para tratar las semillas se recomienda hacer una aplicación antes de la siembra.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Tabu® puede ser aplicado en forma terrestre mediante aspersión foliar o en tratamiento de semillas.

Aplicación foliar: llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua y adicione la cantidad de producto a aplicar según las dosis recomendadas, agite y complete el tanque con agua. Mantener agitación constante de la mezcla y aspérgjala el mismo día de preparada. Garantizar un cubrimiento total de las plantas a tratar. Seguir los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante de los equipos.

Para tratar las semillas: En un local apropiado mezclar la semilla con una solución conteniendo 5 ml de agua/kg semilla y la dosis de Tabu®, asegurándonos que toda la semilla quede impregnada y protegida con el producto. Aplicar el producto con una aspersora de mochila sobre la semilla y mezclar en forma homogénea con una pala. Deje secar la semilla a la sombra por 30 minutos. Sembrar el mismo día que se trató la semilla, evitar guárdala si las condiciones en el campo no son las correctas. En tratamiento por medio de máquinas especiales usado en empresas que manejan semillas realizar según recomendaciones de los fabricantes, garantizando la aplicación homogénea.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Arroz: Plaga: Gusano Cogollero (*Spodoptera frugiperda*): 5 ml/kg.

Plaga: Sogata (*Tagasodes oryzae*): 300 l/ha.

Maíz: 5 ml/kg.

Tomate riñón: 400 l/ha

Piña: 3000 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No se conocen restricciones de su uso. Sin embargo se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala en caso de dudas. A la dosis y condiciones recomendadas no presenta fitotoxicidad en la emergencia de las semillas.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.23-06-2026.VM