

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST – ECUADOR S.A. Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 6061360 Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADO POR:	CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED 301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000 Changzhou, Jiangsu – China
CLASE:	INSECTICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Polvo Soluble (SP)
REGISTRO NACIONAL No.:	35 – I 19 / NA
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO ATENCIÓN 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Acephate.....750 g/kg Excipientes c.s.p. 1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico y por contacto		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Taison® actúa como inhibidor de la acetilcolinesterasa, ocasionando la acumulación de la acetilcolina (ACh) y consecuentemente una sobre estimulación del sistema nervioso, ocasionando parálisis y la muerte de los insectos.		
GRUPO QUÍMICO:	Organofosforados		
CÓDIGO IRAC:	Grupo 1B		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	790000 mg/l	4.0 – 5.5	0.226 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	-0.85	1.35	183.17 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pulguilla (<i>Epitrix cucumeris</i>)	0.20 kg/ha	14 días	72 horas
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pulguilla (<i>Epitrix similis</i>)	0.20 kg/ha	14 días	72 horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Novia del Arroz (<i>Rupela albinella</i>)	0.75 kg/ha	15 días	72 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Papa: Taison® es aplicado al cultivo en la etapa fenológica de crecimiento, después de los 45 días de la siembra. Se recomienda realizar una aplicación, con un daño del 5 % del follaje, en etapa de desarrollo vegetativo.

Arroz: Efectuar una aplicación con el umbral de 1-2 adultos/m², en etapa de desarrollo vegetativo.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previo a la preparación de la mezcla regular el pH del agua a 5.0-5.5, después verter la cantidad necesaria de Taison® al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Papa: 200 l/ha en papa en crecimiento a los 45 días.

Arroz: 300 l/ha cultivo en desarrollo vegetativo, 60 días

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatible con productos alcalinos. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST – ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.23-06-2026.VM