

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST-ECUADOR S.A.**Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium. Edificio Platinum. Piso 07. Oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360**Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMÁ), S.A.

PCC Spec 9097, Local 5#, Panamá Pacífico. Rep. De Panamá

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Gránulos Dispersables en Agua (WG)

REGISTRO NACIONAL No.:

101 – F₃ / NA – CL₃

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 g, 200 g, 250 g, 400 g, 500 g, 600 g, 1 kg, 25 kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4– LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingredientes activos: Cymoxanil.....300 g/kg Famoxadone.....225 g/kg Excipientes c.s.p.....1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida que combina dos principios activos: Cymoxanil con acción protectora y curativa. Famoxadone con acción protectora y residual.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Cyfamox combina dos mecanismos de acción complementarios: Cymoxanil tiene actividad de contacto y sistémica local. Famoxadone actúa principalmente inhibiendo la germinación de esporas.		
GRUPO QUÍMICO:	Cymoxanil: Cianoacetamidas Famoxadone: Oxazolidinedionas		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 27 + Grupo 11		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Cymoxanil:		
	Solubilidad	pH	Presión vapor
	780 mg/l	5.0 - 9.0	0.15 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	0.67	42.1	198.18 g/mol
	Famoxadone:		
	Solubilidad	pH	Presión vapor
	0.059 mg/l	5.0 - 9.0	6.4x10 ⁻⁴ mPa a 20°C

	Kow	Koc	PM
	4.65	6825	374.4 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.6 kg/ha	7 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Papa: Aplicar con el aparecimiento de los primeros síntomas de la plaga, realizar máximo 3 aplicaciones consecutivas con intervalos de 5 a 10 días dependiendo de la presión de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de Cyfamox en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Papa: 600 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatibilidad con álcalis fuertes y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones. Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINOCEMICAL S.A.: 0992500795.



V1.10-06-2026.VM