

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST-ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium. Edificio Platinum. Piso 07. Oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD 30th Floor,
Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan
Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Líquido Miscible en Aceite (OL)

REGISTRO NACIONAL No.:

97-F8/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

1 l, 5l, 10 l, 20 l, 60l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4– LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Fenpropimorph.....880 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Sistémico, con acción protectante y curativa.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Inhibe diferentes pasos en la vía biosintética del ergosterol. La inhibición de la biosíntesis de esteroides conduce finalmente a la muerte de células fúngicas.		
GRUPO QUÍMICO:	Morpholines		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 5		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	4.32 mg/l	4.0 – 9.0	3.5 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	4.5	4382	303.48 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.85 l/ha	0 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Aplicar cuando la hoja tres tenga estrías grado 2, según escala de Preaviso Biológico. No se recomienda hacer más de dos aplicaciones con un intervalo de 14 días.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 60 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatible con álcalis fuertes y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones. Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINOCEMICAL S.A. Teléfono: 0992500795



V1.12-06-2026.VM