

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST-ECUADOR S.A. Matriz Daule: Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium. Edificio Platinum I. Piso 07, Oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 6061360 Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADO POR:	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD. Calle Dimitar Manov 75-83, 1408 Sofía, Bulgaria. Teléfono: +3592 9150 500
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Gránulos Dispersables en Agua (WG)
REGISTRO NACIONAL No.:	1-F8g/NA-CL1
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 kg, 25 kg
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	  CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO PELIGRO          

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Mancozeb..... 750 g/kg Aditivo de importancia toxicológica: Calcium lignosulfonate 33 g/kg Excipientes c.s.p. 1 kg		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida con acción de contacto y sistémico.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Inhiben múltiples enzimas por reacción con grupos sulfhidrilo (-SH) en los hongos, lo que reduce la probabilidad de generar resistencia.		
GRUPO QUÍMICO:	Ditiocarbonatos		
CÓDIGO FRAC:	Grupo M3		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	6.2 mg/l	6.0 – 8.5	0.056 mPa a 20 °C
	Kow	Koc	PM
	2.3	998	271.3 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	2 kg/ha	0 días	24 horas
		10 g/l		

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede ser utilizado durante todos los períodos vegetativos del cultivo. Se aplica en forma preventiva, en intervalos de 7 días. El efecto preventivo se mantiene por 14 días.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

La cantidad requerida de Maxus debe mezclarse con agua, directamente en el balde o en el tanque de spray, asegurándose de mantener el medio bien agitado mientras se completa la cantidad de agua necesaria. Mezclar únicamente con agua limpia. No deberá ser usado para tratar cultivos que muestran una infección activa de quemaduras. Prepara una mezcla fresca cuando se necesite. No almacenar fungicida diluido.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Banano: 200l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatible con productos alcalinos (caldo Bordelés o sulfato de calcio). Maxus no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AGRISEC ECUADOR S.A. Teléfono: 0999938067



V1.12-06-2026.VM