

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST-ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero, Ciudad Millenium. Edificio Platinum I. Piso 07, Oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016686

FORMULADO POR:

SHENYANG TONGXIANG AGROCHEMICAL CO. LTDA.

No. 9 ShenXinBaDong Road, Shenyang Economic & Technological Development Zone, Liaoning Province, 110027 China
Teléfono: 86-24-62665366

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL No.:

44-F4/NA-CL1

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

200 ml, 1 l, 4 l, 5 l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III– LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Bupirimate.....250 g/l Aditivo de importancia toxicológica: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic.....619 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida sistémico con la acción protectora y curativa.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Samar es absorbido por las hojas, con translocación en el xilema y la acción translaminar. Actúa inhibiendo la esporulación. Inhibe la adenosina deaminasa.		
GRUPO QUÍMICO:	Aminopirimidinas		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 8		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	13.06 mg/l	6.0 – 8.0	0.057 mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	3.68	800	316.42 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Cenicilla (<i>Oidium</i> sp.)	1 ml/l	No aplica	12 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Rosa: Realizar dos aplicaciones cada siete días en el área foliar del cultivo de rosa establecido. Verificando previamente la presencia de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Coloque agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de Samar, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Rosa: 2000 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Samar es compatible con otros fungicidas, sin embargo, recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

El producto cuando es aplicado en la dosis recomendada y de acuerdo a lo indicado en la etiqueta no produce efectos fitotóxicos.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
DUAJA DEL ECUADOR S.A. Teléfono: (04) 2325910



V1.26-06-2026.VM