

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.

Matriz Daule: Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Edificio Platinum I. Piso 07. Oficina 702. Daule - Ecuador
Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.
Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000. Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

295-F1/NA-CL3

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 l, 1.5 l, 2.5 l, 200 l, 1 gl, 1.5 gl, 2.5 gl

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN**



INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingredientes activos: Propamocarb hydrochloride.....625 g/l Fluopicolide.....62.5 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Fungicida que combina dos principios activos: Propamocarb hydrochloride con acción protectante. Fluopicolide con acción mesosistémica y protectante.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Propamocarb hydrochloride: Actúa principalmente inhibiendo la germinación de esporas. Fluopicolide: se desplaza hacia las puntas del tallo a través del xilema pero no hacia las raíces.		
GRUPO QUÍMICO:	Propamocarb hydrochloride: Carbamatos Fluopicolide: Benzamidas		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 28 + Grupo 43		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Propamocarb hydrochloride:		
	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	1005000 mg/l	4.0 – 6.0	8.1×10^{-02} mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	-1.4	2 - 35	224.73 g/mol
	Fluopicolide:		
	Solubilidad	pH	Presión de vapor
	2.8 mg/l	6.0 – 9.0	3.03×10^{-04} mPa a 20°C

	Kow	Koc	PM
	2.9	50 – 150	383.58 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 l/ha	14 días	12 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Papa: Aplicar con el apareamiento de los primeros síntomas de la plaga, realizar máximo 2 aplicaciones con intervalos de 7 días dependiendo de la presión de la plaga.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Papa: 600 l/ha

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua a 5.5. Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de Supicarb en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

En caso de requerirse mezclar con otros productos, bajo responsabilidad del usuario, se recomienda hacer pruebas a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis y forma recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINOCEMICAL S.A. Teléfono: 0992500795



V1.15-06-2026.VM